

功能和效果

用於中等體力以下、容易疲勞、容易四肢冰冷、尿量減少或者多尿、時有口渴的人士的以下各種症狀：
下肢疼痛、腰痛、麻痺、老年人視物模糊、瘙癢、排尿困難、殘尿感、夜尿、
尿頻、浮腫、伴隨高血壓改善的症狀（肩酸、頭沉、耳鳴）、輕微漏尿

使用注意事項

禁止事項

以下人士請勿服用：

1. 出生後未滿 3 個月嬰兒
2. 腸胃弱的人士
3. 容易腹瀉的人士

諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - (1) 正在接受醫生治療的人士
 - (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
 - (3) 易上火、面色赤紅並體力充沛的人士
 - (4) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
2. 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振、胃部不適、腹痛
其他	心悸、上火、嘴唇或舌頭發麻

3. 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
腹瀉
4. 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

地黃、山茱萸、山藥、澤瀉、茯苓、牡丹皮、桂皮、附子末

* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學