

功能和效果

用於體力充沛、腹部皮下脂肪多、經常便秘的人士的以下各種症狀：

高血壓或肥胖所伴隨的心悸、肩酸、上火、浮腫、便秘、積膿症（鼻竇炎）、濕疹或皮膚炎、痤瘡（暗瘡）、肥胖症

使用注意事項

禁止事項

- 以下人士請勿服用：
出生後未滿 3 個月嬰兒
- 服用本藥劑的期間、請勿服用以下藥品：
其他瀉藥
- 哺乳期的女士請勿服用本藥劑、或者服用本藥劑期間請勿哺乳

諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - 正在接受醫生治療的人士
 - 孕婦或疑似懷孕的人士
 - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
 - 腸胃弱、容易腹瀉的人士
 - 容易出汗的人士
 - 老年人
 - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
 - 有以下症狀的人士：
浮腫、排尿困難
 - 被診斷為患有以下疾病的人士：
高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	胃部不適、伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛
精神神經系統	眩暈
其他	發汗、心悸、浮腫、頭痛

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難、出現乾咳、發熱等症狀、此類症狀會突然出現或持續
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等
腸系膜靜脈硬化	由於長期服用、反復出現腹痛、腹瀉、便秘、腹脹感等

* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學



防风通圣散 (防風通聖散)

- 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
腹瀉、便秘
- 如果服用 1 個月左右（針對便秘服用時則為一週左右）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。



成份

當歸、芍藥、川芎、山梔子、連翹、薄荷葉、生薑、荊芥、防風、麻黃、大黃、芒硝、(白朮)、桔梗、黃芩、甘草、石膏、滑石

* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學