

## 功能和效果

用於體力充沛、感冒初期、風寒發熱、有頭痛、咳嗽、身體關節痛而不出汗的人士的以下各種症狀：  
感冒、傷風、支氣管炎、鼻塞

## 使用注意事項

### 禁止事項

- 以下人士請勿服用：
  - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
  - 出生後未滿 3 個月的嬰兒
- 僅限於短期服用、不可連續服用

### 諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
  - 正在接受醫生治療的人士
  - 孕婦或疑似懷孕的人士
  - 腸胃弱的人士
  - 容易出汗的人士
  - 老年人
  - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
  - 有以下症狀的人士：
    - 浮腫、排尿困難
  - 被診斷為患有以下疾病的人士：
    - 高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

| 相關部位 | 症狀           |
|------|--------------|
| 皮膚   | 發疹、發紅、瘙癢     |
| 消化系統 | 噁心、食欲不振、胃部不適 |
| 其他   | 出汗過多、全身無力感   |

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

| 症狀名稱        | 症狀                               |
|-------------|----------------------------------|
| 假性醛固酮增多症、肌病 | 除手脚酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強 |

- 如果服用 1 個月左右（針對感冒傷風服用時則服用 5-6 次）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

## 成份

麻黃、桂皮、杏仁、甘草



\* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。  
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

