

功能和效果

用于中等体力以上人士的以下各种症状：

感冒初期（不出汗型）、鼻伤风、鼻炎、头痛、肩酸、肌肉痛、手或肩膀痛

使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：

出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
- (4) 肠胃弱的人士
- (5) 容易出汗的人士
- (6) 老年人
- (7) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- (8) 有以下症状的人士：
 - 浮肿、排尿困难
- (9) 被诊断为患有以下疾病的人士：
 - 高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍

2. 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心、食欲不振、胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

3. 如果服用 1 个月左右（感冒初期、鼻伤风、头痛服用时则为 5-6 次）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

4. 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

葛根、麻黄、大枣、桂皮、芍药、甘草、生姜



* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学



JAPAN KAMPO MEDICINES MANUFACTURERS ASSOCIATION