

功能和效果

用于中等体力以下、身心疲惫、血色不佳、有时会伴有热感的人士的以下各种症状：
贫血、失眠、精神不安、神经症

使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：
出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 老年人
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
 - 有以下症状的人士：
 - 浮肿
 - 被诊断为患有以下疾病的人士：
 - 高血压、心脏病、肾脏病
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
肠系膜静脉硬化	由于长期服用、反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等

- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

人参、白术或苍术、茯苓、酸枣仁、龙眼肉、黄耆、当归、远志、柴胡、山栀子、甘草、木香、大枣、生姜、(牡丹皮)



* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

