

功能和效果

用于中等体力以下，感到上火、肩酸、容易疲劳、精神不稳定或有焦虑等精神神经症状、时有便秘倾向人士的以下各种症状：

畏寒怕冷、体质衰弱、月经不调、月经困难、更年期障碍、女性荷尔蒙失调症^{注)}、失眠症

注) 女性荷尔蒙失调症是指伴随月经、怀孕、分娩、产后、更年期等女性荷尔蒙变化而出现的神经不稳定或焦虑等精神神经症状及身体症状



使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：

出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (2) 肠胃弱的人士
- (3) 老年人
- (4) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- (5) 有以下症状的人士：
 - 浮肿
- (6) 被诊断为患有以下疾病的人士：
 - 高血压、心脏病、肾脏病

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心或呕吐、食欲不振、胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等
肠系膜静脉硬化	由于长期服用、反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等

3. 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 腹泻
4. 如果服用 1 个月左右症状仍未好转，请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
5. 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

当归、芍药、白术或苍术、茯苓、柴胡、牡丹皮、山栀子、甘草、生姜、薄荷叶

* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

