

## 功能和效果

比较有体力、时有下腹疼痛、肩酸、头沉、眩晕、上火且脚冰冷等症人士的以下各种症状：  
月经不调、月经异常、痛经、更年期障碍、女性荷尔蒙失调症、肩酸、眩晕、头沉、跌打损伤（碰撞挫伤症）、冻伤、斑点、湿疹或皮肤炎、暗疮

## 使用注意事项

## 禁止事项

以下人士请勿服用：  
出生后未滿 3 个月的婴儿

## 咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
  - 正在接受医生治疗的人士
  - 孕妇或疑似怀孕的人士
  - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
  - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症状       |
|------|----------|
| 皮肤   | 发疹、发红、瘙痒 |
| 消化系统 | 食欲不振     |

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

| 症状名称  | 症状                                    |
|-------|---------------------------------------|
| 肝功能障碍 | 出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等 |

- 服用后可能会出现以下症状、如果此类症状持续或增强、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：  
腹泻
- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

## 成份

桂皮、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍药



\* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。  
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

