

## 功能和效果

用于中等体力以上、出现强烈咳嗽的以下各种症状：  
咳嗽、支气管哮喘、支气管炎、小儿哮喘、感冒、痔疮疼痛

## 使用注意事项

## 禁止事项

以下人士请勿服用：  
出生后未满 3 个月的婴儿

## 咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
  - 正在接受医生治疗的人士
  - 孕妇或疑似怀孕的人士
  - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士、容易腹泻的人）
  - 肠胃弱的人士
  - 容易出汗的人士
  - 老年人
  - 有以下症状的人士：  
浮肿、排尿困难
  - 被诊断为患有以下疾病的人士：  
高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心、食欲不振、胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强

- 如果服用 1 个月左右（针对感冒服用时则为 5-6 天）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

## 成份

麻黄、杏仁、甘草、石膏、桑白皮



\* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。  
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学