

## 功能和效果

用于中等体力以下的人士的下面各种症状：  
尿频、排尿痛、残尿感、尿的浑浊

## 使用注意事项

## 禁止事项

以下人士请勿服用：  
出生后未满 3 个月的婴儿

## 咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
  - 正在接受医生治疗的人士
  - 孕妇或疑似怀孕的人士
  - 肠胃弱、容易腹泻的人士
  - 老年人
  - 有以下症状的人士：  
浮肿
  - 被诊断为患有以下疾病的人士：  
高血压、心脏病、肾脏病
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
消化系统	食欲不振、胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
肠系膜静脉硬化	由于长期服用、反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等

- 服用后可能会出现以下症状、如果此类症状持续或增强、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：  
腹泻
- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

## 成份

茯苓、当归、黄芩、甘草、芍药、山栀子、(地黄、泽泻、木通、滑石、车前子)



\* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。  
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

