

功能和效果

可用于各种体力、口渴且尿量少的人士伴随有眩晕、恶心、呕吐、腹痛、头痛、浮肿等某种症状的以下各种症状：
水样性腹泻、急性肠胃炎（里急后重的症状不要服用）、中暑、头痛、浮肿、宿醉

使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：
出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症状 |
|------|----------|
| 皮肤 | 发疹、发红、瘙痒 |

- 如果服用 1 个月左右（针对急性肠胃炎、宿醉服用时则服用 5-6 次、针对水样性腹泻、中暑服用时则服用 5-6 天）
症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

泽泻、猪苓、茯苓、白术或苍术、桂皮



* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学