

**功能和效果**

可用于各种体力、有伴随剧烈肌肉痉挛的疼痛的人士的以下各种症状：  
抽筋、肌肉痉挛、腹痛、腰痛

**使用注意事项****禁止事项**

- 以下人士请勿服用：
  - 出生后未满 3 个月的婴儿
  - 被诊断为患有以下疾病的人士：  
心脏病
- 请只在出现症状时服用、请勿连续服用

**咨询事项**

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
  - 正在接受医生治疗的人士
  - 孕妇或疑似怀孕的人士
  - 老年人
  - 有以下症状的人士：  
浮肿
  - 被诊断为患有以下疾病的人士：  
高血压、肾脏病
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
充血性心力衰竭、室性心动过速	出现全身酸软、心悸、气喘、胸部不适、胸痛、眩晕、昏迷等
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 如果服用 5-6 次症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

**成份**

芍药、甘草



\* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。  
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

