

功能和效果

用于中等体力、时有胸胁苦满、食欲不振或口苦、舌上白苔的人士的以下各种症状：
食欲不振、恶心、胃炎、胃痛、肠胃弱、疲劳感、感冒后期的各种症状

使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：
出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - 老年人
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
 - 有以下症状的人士：
 - 浮肿
 - 被诊断为患有以下疾病的人士：
 - 肝脏病、高血压、心脏病、肾脏病
 - 正在接受干扰素制剂治疗的人士
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
其他	尿频、小便刺痛、血尿、残尿感

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 如果服用 1 个月左右（针对感冒后期各种症状服用时则服用 1 周左右）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

柴胡、半夏、生姜、黄芩、大枣、人参、甘草



* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

