

功能和效果

用于中等体力、有疼痛、有时会发麻的以下诸多症状：
关节痛、神经痛、腰痛、肌肉痛

使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：
出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 肠胃弱、容易腹泻的人士
 - 老年人
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
 - 有以下症状的人士：
 - 浮肿
 - 被诊断为患有以下疾病的人士：
 - 高血压、心脏病、肾脏病
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强

- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

当归、地黄、川芎、苍术或白术、茯苓、桃仁、芍药、牛膝、威灵仙、防己、羌活、防风、龙胆、生姜、陈皮、白芷、甘草



* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

