

功能和效果

用于身体强壮、从侧腹到胸口有不适、有便秘倾向的人士的以下各种症状：
胃炎、习惯性便秘、高血压或肥胖所伴随的肩酸、头痛、便秘、神经症、肥胖症

使用注意事项

禁止事项

- 以下人士请勿服用：
出生后未满 3 个月的婴儿
- 服用本药剂的期间、请勿服用以下药品：
其他泻药
- 哺乳期的人士请勿服用本药剂、或者服用本药剂期间请勿哺乳

咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - 肠胃弱、容易腹泻的人士
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 服用后可能会出现以下症状、如果此类症状持续或增强、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：
腹泻
- 如果服用 1 个月左右（针对习惯性便秘、高血压或肥胖伴随的便秘服用时则为 5-6 天）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

柴胡、半夏、生姜、黄芩、芍药、大枣、枳实、大黄



* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学



JAPAN KAMPO MEDICINES MANUFACTURERS ASSOCIATION