

功能和效果

用于中等体力以下、容易疲劳、容易四肢冰冷、尿量减少或者多尿、时有口渴的人士的以下各种症状：
下肢疼痛、腰痛、麻痹、老年人视物模糊、瘙痒、排尿困难、残尿感、夜尿、尿频、浮肿、
伴随高血压改善的症状（肩酸、头沉、耳鸣）、轻微漏尿

使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：

1. 出生后未满 3 个月的婴儿
2. 肠胃弱的人士
3. 容易腹泻的人士

咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - (1) 正在接受医生治疗的人士
 - (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
 - (3) 易上火、面色赤红并体力充沛的人士
 - (4) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
2. 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适、腹痛
其他	心悸、上火、嘴唇或舌头发麻

3. 服用后可能会出现以下症状、如果此类症状持续或增强、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：
腹泻
4. 如果服用 1 个月左右症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮、桂皮、附子末

* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药学系 教授 日本药科大学

