

## 功能和效果

用于中等体力、感到胸口堵塞、时有恶心、呕吐、食欲不振、腹部鸣响且有软便或腹泻倾向的人士的以下各种症状：  
急性或慢性肠胃炎、腹泻或软便、消化不良、胃下垂、神经性胃炎、胃弱、宿醉、暖气、烧心、口腔溃疡、神经症

## 使用注意事项

## 禁止事项

以下人士请勿服用：  
出生后未满 3 个月的婴儿

## 咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
  - 正在接受医生治疗的人士
  - 孕妇或疑似怀孕的人士
  - 老年人
  - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
  - 有以下症状的人士：
    - 浮肿
  - 被诊断为患有以下疾病的人士：
    - 高血压、心脏病、肾脏病
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 如果服用 1 个月左右（针对急性肠胃炎、宿醉、暖气、烧心服用时则服用 5-6 次）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

## 成份

半夏、黄芩、干姜、人参、甘草、大枣、黄连

\* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。  
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学