

## 功能和效果

用于体力充沛、腹部皮下脂肪多、经常便秘的人士的以下各种症状：

高血压或肥胖所伴随的心悸、肩酸、上火、浮肿、便秘、积脓症（鼻窦炎）、湿疹或皮肤炎、痤疮（暗疮）、肥胖症

## 使用注意事项

## 禁止事项

- 以下人士请勿服用：
  - 出生后未满 3 个月的婴儿
- 服用本药剂的期间、请勿服用以下药品：
  - 其他泻药
- 哺乳期的人士请勿服用本药剂、或者服用本药剂期间请勿哺乳

## 咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
  - 正在接受医生治疗的人士
  - 孕妇或疑似怀孕的人士
  - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
  - 肠胃弱、容易腹泻的人士
  - 容易出汗的人士
  - 老年人
  - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
  - 有以下症状的人士：
    - 浮肿、排尿困难
  - 被诊断为患有以下疾病的人士：
    - 高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	胃部不适、伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛
精神神经系统	眩晕
其他	发汗、心悸、浮肿、头痛

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等
肠系膜静脉硬化	由于长期服用、反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等

\* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。  
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学



# 防风通圣散

(防風通聖散)

3. 服用后可能会出现以下症状、如果此类症状持续或增强、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：  
腹泻、便秘
4. 如果服用 1 个月左右（针对便秘服用时则为 1 周左右）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
5. 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。



## 成份

当归、芍药、川芎、山栀子、连翘、薄荷叶、生姜、荆芥、防风、麻黄、大黄、芒硝、(白术)、桔梗、黄芩、甘草、石膏、滑石

\* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。  
监修：陈福士博士 医疗商业药学系 教授 日本药科大学