

功能和效果

用于体力虚弱、没精神、肠胃功能衰退、容易疲劳的人士的以下各种症状：
体质衰弱、疲劳乏力、病后或术后的衰弱、食欲不振、盗汗、感冒

使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：
出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 老年人
 - 至今曾有因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
 - 有以下症状的人士：
浮肿
 - 被诊断为患有以下疾病的人士：
高血压、心脏病、肾脏病
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症状 |
|------|----------|
| 皮肤 | 发疹、发红、瘙痒 |

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

| 症状名称 | 症状 |
|-------------|---|
| 间质性肺炎 | 上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续 |
| 假性醛固酮增多症、肌病 | 除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外、还出现乏力感、肌肉痛、并逐渐增强 |
| 肝功能障碍 | 出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等 |

- 如果服用 1 个月左右（针对感冒服用时则为 5-6 天）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

人参、白术或苍术、黄耆、当归、陈皮、大枣、柴胡、甘草、生姜、升麻



* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

